

M. Bouvier, chir. orthop. élève
de l'Acad. de Médecine, agrégé
des facultés

7^{ème} Rue de la Harpe Paris
N^o 5553

Il existe une légère déviation commençante dans la
colonne épinière. La région lombaire surtout est
courbée d'une manière sensible sur le côté gauche. Il est
essentiel d'agir dès à présent de manière à borner
les progrès de ce dérangement. Je conseille dans ce
but les moyens suivants.

Faire coucher l'enfant la nuit sur un
matelas assez ferme pour en prévenir l'affaissement
sous le poids du corps et légèrement bombé. Supprimer
les oreillers et y suppléer en dormant au coussin
plus délévatoire à la tête. L'entretenir sur le
dos par des épaulettes fixées aux côtés du lit.

Coucher l'enfant également cinq heures par jour en
couchant sur le dos ou trois fois sur le dos ou l'estomac
en levant à cet effet trois fois du lit, soit d'un
canapé ou d'une planche rembourrée disposée de
la même manière.

Faire porter quatre heures par jour environ un
corset à tuteurs.

pendant une à 2 heures faire pratiquer ^{sans corset} des
mouvements de suspension à une échelle, une poutre etc.



Encore aussi l'impact à marches lève le corps
sur une planche étroite, la tête chargée d'un
liger fardeau, comme un coussin, une pelotte etc.

Éviter toute fatigue excessive et après une
lassitude quelconque, conduire l'enfant comme on
dit plus haut. Éviter qu'elle ne reste assise
plus de deux heures, qu'elle ne prenne une
inflexion habituelle dans son maintien.

La natation serait très utile.

Le régime sera essentiellement fortifiant.

Le 6 juin 1883

J. Bourin
Dr. M. T.
Pr. M. J.

M. Martin mécanicien rue de
la fonderie n° 6 section n° 9
sous les charniers pour un corset
à futures